

## Профилактика бешенства

Бешенство – это острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Всегда заканчивается смертью. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

В Удмуртской Республике ежегодно регистрируются десятки случаев заражения бешенством у диких и домашних животных, которые заканчиваются гибелью животных. Чаще заболевание бешенством возникает у лис, лосей, енотовидных собак, а также у домашних кошек, собак, крупного и мелкого рогатого скота, реже – у птиц. Признаком болезни у животного может быть его необычное поведение – дикие животные выходят из мест обитания в пределы поселений и нередко становятся агрессивными, нападают на людей. Иногда животные при заболевании бешенством становятся необычно «ласковыми» - играют с людьми, облизывают руки, что приводит к заражению человека. При этом часто страдают дети, для которых появление диких животных (особенно лисиц) в пределах города или поселка вызывает желание с ними поиграть. Заражение домашних животных может происходить не только при контакте с диким животным, но и при выгуливании, когда возможен контакт с выделениями больных животных и при контакте с погибшими от бешенства грызунами. Высок риск заражения бешенством у бродячих собак и кошек. Обязательная вакцинация домашних животных против бешенства обеспечивает защиту их владельцев от заражения.

*При укусе, оцарапывании или ослюнении животным необходимо тщательно промыть место контакта водой с мылом и обработать любым спиртовым раствором (настойка йода, раствор бриллиантового зеленого и т.д.). Затем необходимо немедленно обратиться в травматологическую поликлинику (в г. Ижевске - ул. Краева, д. 37а) для начала антирабической вакцинации. Позднее начало лечебной антирабической вакцинации может быть причиной заболевания бешенством у человека.*

После обращения в травматологическую поликлинику в связи с укусом или оцарапыванием животным необходимо немедленно обратиться в поликлинику по месту жительства для решения вопроса о необходимости экстренной вакцинации против столбняка. Если Вы привиты против столбняка более 10 лет назад – необходима экстренная вакцинация вакциной АДС-м независимо от возраста.